

種類	対象年齢	回数	間隔	備考
五種混合	生後2か月～90か月児	3回	20日以上	*接種間隔を確認して接種すること
		1回	初回（3回目）接種後6か月以上	*2期接種（2種混合）：小学校6年生 通知・問診票は対象年度に配布します
B C G	生後12か月未満	1回		*接種後10日以内に接種部位に明らかな腫れや化膿があった場合は、医療機関に相談してください。
MRワクチン (麻しん・風しん)	1期 生後12～24か月未満	1回		*通算して2回接種します
	2期 5歳以上7歳未満の児 (次年度小学校1年生になる児)	1回		*第2期の通知・問診票は対象年度に配布します
水痘 (水ぼうそう)	生後12～36か月未満	1回		*通算して2回接種します
		1回	1回目接種後3か月以上 (標準：6～12か月以上)	*接種間隔を確認して接種すること
日本脳炎	生後6か月～90か月未満	2回	6日以上 (標準：6～28日以上)	*間隔を確認して接種すること
		1回	初回（2回目）接種後6か月以上 (標準：1年以上)	*2期接種：小学校4年生 通知・問診票は対象年度に配布します
接種回数 / 接種間隔				
小児用肺炎球菌	生後2か月～60か月未満	<p>*接種回数は、接種開始時の月齢により異なります</p> <p><b>【接種開始が生後2～7か月になる前日】</b>  初回接種：27日以上の間隔を置いて<b>3回</b>接種（※生後24か月までに完了）  ※標準的には生後12か月までに3回接種  ※生後24か月までに2・3回目の接種ができなかった場合は、追加接種として1回  ※2回目の接種が生後12か月を超えた場合は3回目は接種せず、追加接種として1回  追加接種：初回接種（3回目）接種後、60日以上おき、かつ生後12か月以降に<b>1回</b>接種</p> <p><b>【接種開始が生後7～12か月になる前日】</b>  初回接種：27日以上の間隔を置いて<b>2回</b>接種（※生後24か月までに完了）  ※標準的には生後12か月までに2回接種  ※生後24か月までに2回目の接種ができなかった場合は、追加接種として1回  追加接種：初回接種（2回目）接種後、60日以上おき、かつ生後12か月以降に<b>1回</b>接種</p> <p><b>【接種開始が生後12～24か月になる前日】</b>  60日以上の間隔を置いて<b>2回</b>接種</p> <p><b>【接種開始が生後24～60か月になる前日】</b>  <b>1回</b>接種</p>		
B型肝炎	生後2か月～12か月未満	4週間以上の間隔を置いて2回接種した後、 <b>1回目</b> の接種から20～24週の間隔を置いて1回接種 (※9か月になるまでに3回接種します)		
ロタウイルス	出生6週0日後～24週0日未満	<b>【1価】</b> 2回	27日	*1価・5価のいずれかのワクチンを選択し、同一ワクチンで接種してください。  *経口接種後に接種液を吐き出した場合、追加の投与は必要ありません。
	出生6週0日後～32週0日未満	<b>【5価】</b> 3回		

★予防接種は協力医療機関で実施します。

医療機関によって、予約制で実施している場合や、実施日時が決まっている場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

★持参する物：母子健康手帳・予診票（※予診票は町から配布されている物を使用してください）

★掲載されているワクチン以外についてはお問い合わせください。

